

# 予防接種 指定医療機関

令和8年4月現在

病院名	住所(TEL)	接種日時	
あくつこども クリニック <small>※BCGは原則予約制</small>	10条西4丁目 (33-8000)	月 火 水 金	9:00~11:30 (BCGは11:00まで) 14:00~17:30 (BCGは17:00まで)
		木 土	9:00~11:30 (BCGは11:00まで)
岩見沢 市立総合病院 (小児科外来)	9条西7丁目 (22-1650)	月	13:30~15:30
心と体の小児科 ふじねクリニック <small>※予防接種は全て予約制</small>	7条東6丁目 (35-5617)	月 火 水 金	9:30~12:00 / 13:30~17:00
		土	9:30~12:00 / 13:30~14:30
さとうキッズ クリニック <small>※BCG・HPVワクチンは 予約制</small>	大和1条9丁目1-1 〔大和タウンプラザ〕 ビッグハウス2F (20-0310)	月 火 木 金	8:30~11:30 / 13:30~18:00
		土	8:30~12:00
出口小児科医院	7条西5丁目 (22-3570)	月 火 水 金	8:30~11:30 / 13:30~17:30
		木 土	8:30~11:30

※予防接種の種類により、曜日、時間が異なる場合がありますので、必ずご確認ください。

◎ 予防接種の年齢は幅広く決められていますが、できるだけ標準的接種期間に受けましょう。

岩見沢市の「すこやか健康手帳」  
(LINEアプリ:無料)で、予防接種の  
スケジュール管理ができます。



- 【その他の機能】
- 健康・子育て情報の配信
  - 保健師などに相談
  - 成長記録の共有 など

お問合せは

**岩見沢保健センター**

岩見沢市4条西3丁目 であえーる岩見沢3階

でんわ **0126-25-5540**



健康づくり普及員  
イワくん

岩見沢市

# 定期予防接種予診票



★ 綴っている予診票 2枚複写になっています。

● ロタリックス(2回)を接種された方は、予診票が1部余ります。

ロタウイルス感染症	3部	BCG	1部
B型肝炎	3部	麻しん風しん混合	1部
小児の肺炎球菌感染症	4部	水痘(水ぼうそう)	2部
5種混合	4部		

※上記以外の定期予防接種については、該当年齢時に個別通知をする予定です。

★ 予防接種を受ける際には、「予防接種予診票」と「母子健康手帳」が必要です。接種する予防接種の予診票を記入し、指定医療機関に持って行ってください。

★ 当日は診察のしやすい下着を着用していきましょう。

★ 予防できる病気や副反応などの詳細は「予防接種のしおり」をご覧ください。接種する前には必ず「予防接種のしおり」を読み、理解してから接種しましょう。


★ この予診票は岩見沢市以外では使用できません。転出した場合は転出先の市町村にお問合せください。

★ 入院等の特別な事情により岩見沢市以外での接種を希望する場合市が発行する依頼書が必要になります。下記までご連絡ください。

岩見沢保健センター (岩見沢市4条西3丁目 であえーる岩見沢3階 ☎25-5540)

# 定期予防接種スケジュール (3才未満)

◎新しいワクチンが導入されたり、制度が変更されたりすることがあります。予防接種の種類、接種方法など変更になる場合は、広報「いわみざわ」及びホームページに掲載しますのでご覧ください。 ◎数字はあくまでも目安です。かかりつけ医と相談しましょう。

ワクチン (予防する病気)		接種できる年齢 (標準的な接種年齢)	接種回数	0 か月	1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	1 歳	2 歳
<b>ロタウイルス感染症</b> (胃腸炎)  生ワクチン	ロタリックス (1価)  生後6週から生後24週まで (初回接種については、生後2か月～生後14週6日まで)	2回				①	②										
	ロタテック (5価)  生後6週から生後32週まで (初回接種については、生後2か月～生後14週6日まで)	3回				①	②	③									
<b>B型肝炎</b>  不活化ワクチン	1歳未満 (生後2か月～9か月未満)  母子感染予防のため、健康保険で接種を受けたことのある お子さんは定期接種の対象になりません。	3回				①	②				③						
<b>小児の肺炎球菌感染症</b> (主に髄膜炎)  不活化ワクチン	生後2か月～5歳未満																
	・2か月～7か月未満で開始の場合	4回				①	②	③									
	・7か月～12か月未満で開始の場合	3回															
	・1歳～2歳未満で開始する場合	2回															
<b>5種混合 (DPT-IPV-Hib)</b> ジフテリア (D) 百日せき (P) 破傷風 (T) ポリオ (P) ヒブ感染症 (Hib)  不活化ワクチン	<b>【1期初回 (3回)】</b> 生後2か月～90か月未満 (生後2か月～7か月未満)	3回				①	②	③									
<b>【1期追加】</b> 初回 (3回) 接種終了後6か月以上 (6か月～1年半の間)	1回																
<b>BCG (結核)</b>  生ワクチン	満1歳未満 (生後5か月～8か月未満)	1回								①							
<b>麻しん (M)</b> (はしか)  <b>風しん (R)</b> (三日はしか)  生ワクチン	<b>【第1期】</b> 満1歳～2歳未満	1回															
<b>【第2期】</b> 5歳～7歳未満の子で就学前の1年間 ☆(時期が近くなりましたら、案内を送付します)	1回															①	
<b>水痘 (みずぼうそう)</b>  生ワクチン	満1歳～3歳未満 (1回目: 満1歳～1歳3か月 2回目: 1回目接種から、6か月から12か月の間)	2回															①
<b>日本脳炎</b>  不活化ワクチン	<b>【1期】</b> 生後6か月～90か月未満 (1期初回 (2回) : 3歳 1期追加 : 4歳 ☆(時期が近くなりましたら、案内を送付します))	3回															

以下のような症状が一つでもみられた場合は、腸重積症の可能性が  
あります。症状を長引かせないよう日頃とかわった様子があれば、速やかに医師  
の診察を受けてください。

腸重積症 (腸の一部が腸の他の部分に入り込み、腸が閉塞した状態) の主な症状  
 嘔吐を繰り返す     泣いたり不機嫌になったりを繰り返す  
 くったりして、元気がない     血便 (粘液と血が混じったような便) がでる

●接種後21日間 (主に7日間) は腸重積症の発症リスクが少し増加する可能性があると考えられて  
います。この期間とはく上記症状に注意してください。

定期接種の推奨期間    定期接種の接種可能な期間

※複数回接種するものは、接種間隔を必ず確認してください。