



ワクチン接種費用は無料です！ こんなことは絶対にありません



✕ 市役所や厚生労働省の職員が、ワクチン接種費用の振り込みを求めること

「優先してワクチンが接種できる。後日全額返金するので、お金を振り込むように」といった電話

✕ 市役所や厚生労働省の職員が、ワクチン接種のために個人情報や電話やメールで聞くこと

「ワクチンの接種に必要なので、マイナンバーを教えてください」といった電話

「優先してワクチンの接種ができる」といった内容のメールで、記載された URL に誘導するもの

不審な電話はすぐに切り、メールは URL をクリックしたり返信したりしないようにしましょう

不審な電話やメールが来たら、すぐに相談を
 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン ☎ 0120-797-188
 厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター ☎ 0120-761-770
 警察相談専用電話 ☎ #9110
 岩見沢市消費者センター ☎ 23-7987
 市役所市民連携室市民相談・交通防犯係

ワクチンに関するお知らせ

接種スケジュールが変わりました


現時点ではワクチンの供給量が限られているため、当面は高齢者施設に入所している方に限定して先行接種を行います。その他の65歳以上の方への接種は、十分な数量が確保でき次第、開始する予定です。
 問合せ 新型コロナウイルスワクチン接種対策部（4西3 であえーる岩見沢4階） ☎ 35-7515



※3月18日時点の情報を基に作成しています。ワクチンの供給状況などによって、今後もスケジュールが変わることがあります。

ワクチン接種スケジュール 接種無料

期間を空けて2回接種する必要があります



最新の情報は市ホームページをご確認ください



※市外の施設入所や入院中のため、市内の医療機関で接種できない方はご相談ください。

65歳未満の方への接種は、決まり次第、広報いわみざわや市ホームページなどでお知らせします

北海道スタイルを実践し感染の再拡大を防ごう

年度末・年度始めは、人の移動や歓送迎会などの会食の機会が増える時期です。感染の再拡大を防止するためにも、感染対策を徹底しましょう。
 問合せ 健康づくり推進課（4西3 であえーる岩見沢3階） ☎ 25-5540

外出の際は

- 体調が悪いときは外出を控える
- 重症化リスクの高い方と接する際は、リスク回避行動を徹底する
- 感染拡大地域への訪問は、行き先などを慎重に検討する



飲食の際は

- 業種別ガイドラインや北海道スタイルの実践などを宣言している店舗を利用する
- “黙食”を実践する（4人以内の少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の際はマスクを着用）




職場では

- 業種別ガイドラインや北海道スタイルの実践を進める
- 休憩場所など、感染リスクが高い場所での対策を徹底する
- テレワークや時差出勤を推進する



年度末・年度始めは

- 引越しの時期を分散化する
- 歓送迎会や謝恩会などを控える
- 入学式・入社式などでは、感染防止を徹底する



国民健康保険・後期高齢者医療制度 傷病手当の支給 対象期間の延長

対象	国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している、次のすべてを満たす方 ●給与などの支払いを受けている ●新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与などの全部または一部を受けることができない
対象期間	令和2年1月1日から令和3年6月30日の間で、療養のため就労ができなくなった日から起算して、4日目以降就労ができない期間
手続きなど	詳しくはお問い合わせください
申請・問合せ先	医療年金課（国民健康保険は国保係、後期高齢者医療制度は医療助成係）

接種に関する Q&A

ワクチンにはどのような効果があるの？

ファイザー社のワクチンは、2回の接種で約95%の有効性（インフルエンザワクチンは約40～60%）があると報告されており、発熱や咳などの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認められています。



最近よく聞く「変異株、にも効果はあるの？

ウイルスは絶えず変異を起こしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるといわけではありません。また、ファイザー社のワクチンでは、変異株の新型コロナウイルスにも作用する抗体が作られたという実験結果も発表されています。変異株に関することも含め、国は引き続きさまざまな情報を収集し、適切に有効性、安全性などを確認していきます。

持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けられるの？

「薬を飲んでいるからワクチンを受けられない」ということはありませんが、免疫不全のある人や病状が重い人など、基礎疾患によっては接種を慎重に検討した方がよい場合があります。かかりつけ医と相談してください。また、抗凝固薬（血液をサラサラにする薬の一部）を飲んでいる人は、ワクチンを受けた後、2分以上しっかり押さえてください。

※首相官邸、厚生労働省のホームページを基に作成。